

ESPERMIOCULTIVO

Instrucciones para la recogida de muestras

<p>RECIPIENTE</p>	<p>Recipiente de plástico estéril con tapón de rosca.</p> 
<p>MODALIDAD</p>	<p>Si al mismo tiempo también se solicita una prueba de urocultivo, es necesario recoger antes la muestra de orina y después el líquido seminal. No es necesaria la abstinencia de relaciones sexuales. Cualquier terapia con antibióticos debe haberse completado al menos 7 días antes de proceder con el examen.</p> <p>ATENCIÓN: Si al mismo tiempo también se solicita el hisopo uretral, éste deberá realizarse preferentemente en un día diferente al de la recogida del líquido seminal y/u orina. Si esto no fuera posible, deberán transcurrir al menos 2 horas entre el hisopo uretral y la recogida de semen y/u orina.</p> <p>Recogida de líquido seminal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recogerlo por la mañana temprano • Limpiar cuidadosamente los genitales retrayendo la piel del glande y enjuagar abundantemente con agua corriente. • Orinar para eliminar la flora saprofita (microorganismos normalmente presentes) del canal uretral. Si ya se ha recogido el chorro intermedio (segundo chorro de orina) para el urocultivo, ignorar este paso. • Proceder con la recogida del semen mediante la masturbación. • Acoger el líquido seminal directamente en el recipiente estéril. • Cerrar la tapa enroscándola con cuidado.
<p>CONSERVACIÓN</p>	<p>Entregar la muestra de líquido seminal (y eventualmente también la muestra para el urocultivo) en el plazo de 1 hora desde su recogida, si esto no fuera posible, conservar la muestra en el refrigerador a 4°C hasta la entrega.</p>

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	14 di 19